

## Série 11

**Exercice 1.** Soit  $(X, x_0)$  un espace topologique pointé, et soit  $\Sigma X$  sa suspension réduite (confer série 5). Montrer que l'application

$$\begin{aligned} X \times I &\longrightarrow \Sigma X \vee \Sigma X \\ (x, t) &\longmapsto \begin{cases} [x', 2t] : 0 \leq t \leq \frac{1}{2} \\ [x'', 2t - 1] : \frac{1}{2} \leq t \leq 1 \end{cases} \end{aligned}$$

(où  $x'$  dénote la copie à gauche et  $x''$  celle à droite dans  $\Sigma X \vee \Sigma X$ ) induit une application continue pointée

$$q : \Sigma X \rightarrow \Sigma X \vee \Sigma X.$$

**Remarque 1.** Noter que pour tout  $n \geq 1$ , on a  $S^n \cong \Sigma S^{n-1}$ .

**Exercice 2.** Utiliser l'application  $q$  pour définir une structure de groupe naturelle sur

$$[\Sigma X, Y]_*$$

pour tout  $(X, x_0), (Y, y_0)$ .

**Exercice 3.** Montrer que  $\forall (X, x_0), (Y, y_0)$  il y a un isomorphisme de groupe

$$[\Sigma X, Y]_* \cong [X, \Omega Y]_*$$

naturel en  $X$  et en  $Y$ .

**Corollaire 1.**  $\pi_n(X, x_0) \cong \pi_1(\Omega^{n-1}X, *) \forall n \geq 2$  et donc (par l'exercice 2c), série 3)

$$\pi_n(X, x_0) \text{ est abélien.}$$